

УДК 616.314.17-008.1-08:615.015.32

ЗАСТОСУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА

В. Д. Свердлова, Т. М. Позднякова

Дорожня клінічна лікарня на станції Донецьк Донецької залізниці

Ключові слова: захворювання пародонта, лікування, гомеопатичні препарати.

За даними ВООЗ, хвороби пародонта є найпоширенішою стоматологічною патологією. Захворювання пародонта наявні у 92% осіб молодого віку (18–20 років), а у пацієнтів віком понад 40 років частота цієї патології досягає ста відсотків.

Комплексне лікування захворювань пародонта становить актуальну проблему.

Застосування антибіотиків і сульфаніламідів у лікуванні зумовлює побічні реакції організму. Ми зацікавилися гомеопатичними препаратами німецької фармацевтичної фірми «Хеель»: «Траумель С», «Цель-Т», «Дискус композитум», «Ехінацея композитум С». Приваблює передусім нетоксичність та відсутність побічної дії препаратів цієї фірми на організм. Згідно з інформацією виробника, препарати чинять протизапальну, противірусну, антиексудативну, регенерувальну, знеболювальну, гемостатичну, імуностимулювальну дію, підтримують та поліпшують клітинне дихання та окислювально-відновні процеси в тканинах. Основними компонентами цих препаратів є екстракти рослин, органів тварин та мінеральні речовини.

Метою нашого дослідження було вивчити вплив, оцінити клінічний ефект застосування гомеопатичних препаратів фірми «Хеель» у комплексі традиційної терапії пацієнтів із захворюваннями пародонта.

Під нашим спостереженням були 72 пацієнти з генералізованим пародонтитом I та II ступеня тяжкості віком від 35 до 57 років.

Залежно від показань до лікування усіх пацієнтів розподілили на дві групи: основну та контрольну.

Пацієнтам першої групи (52 особи), окрім традиційного лікування пародонтиту, призначали гомеопатичні препарати «Траумель С», «Цель-Т», «Дискус композитум», «Ехінацея композитум С». При цьому брали до уваги вік хворого та тяжкість перебігу захворювання і застосовували таку схему:

1) ін'єкції гомеопатичних препаратів у перехідну складку один раз на день, дозування 2,2, протягом 5–10 днів;

2) застосування таблеток препарату «Траумель С» (по 1 таблетці сублінгвально, тричі на день) протягом 10–12 днів.

3) місцеве застосування мазей «Траумель С» та «Цель-Т» у пародонтальні кишені.

Пацієнтам контрольної групи (20 осіб) проводили тільки традиційне комплексне лікування.

Гігієнічний стан порожнини рота у хворих обох груп до лікування був незадовільним, а симптоматичний гінгівіт відповідав середньому ступеню тяжкості.

Результати лікування оцінювали через 3, 6, 12 місяців.

Усіх пацієнтів обстежували за єдиною схемою, до якої входили клінічні методи дослідження, рентгенографія альвеолярної кістки, визначення індексів гігієни (ОHI-S), гінгівіту (РМА) (табл. 1).

Таблиця 1

Індексна оцінка стану гігієни ротової порожнини та тканин пародонта

Група	Період спостереження			
	до початку лікування	через 3 міс.	через 6 міс.	через 12 міс.
<i>Індекс ОHI-S</i>				
Основна	1,76	0,24	0,25	0,53
Контрольна	1,76	0,6	0,56	1,51
<i>Індекс РМА</i>				
Основна	1,14	0,24	0,38	0,61
Контрольна	1,14	0,44	0,77	0,99

Після лікування стан у ділянці ураження та загальна картина захворювання мали значні позитивні зрушення вже через три-чотири відвідування. Істотно зменшилися кровотеча, біль у яснах.

У пацієнтів з пародонтитом I ступеня тяжкості запальні явища в тканинах пародонта зникли практично повністю. Ясна ущільнилися, набряку і гіперемії не було, зменшилася глибина пародонтальних кишень. У хворих на пародонтит II ступеня тяжкості ознаки симптоматичного гінгівіту зникли в середньому через п'ять-шість сеансів. Зменшилася рухливість зубів і глибина пародонтальних кишень.

У хворих контрольної групи лікування тривало довше: для стабілізації патологічного процесу в разі пародонтиту I ступеня тяжкості було потрібно від 7 до 9 відвідувань, II ступеня — 11 або 12 відвідувань.

Кількість негативних результатів лікування та рецидивів зменшувалася, періоди стабілізації ге-

нералізованого пародонтиту довшали на тлі застосування гомеопатичних препаратів.

Висновки

1. Застосування гомеопатичних препаратів у схемі комплексного лікування пародонтиту пришвидшує ліквідацію запально-дистрофічного процесу в пародонті.

2. Ці препарати скорочують тривалість лікування завдяки значному підвищенню захисних реакцій організму та сприяють тривалій клініко-рентгенологічній стабілізації у більшій кількості осіб.

3. Терапевтичний ефект від застосування гомеопатичних препаратів ми вважаємо цілком задовільним.

4. Негативних побічних реакцій у зв'язку із застосуванням цих препаратів ми не відзначили.

5. Вважаємо, що цей метод лікування захворювань пародонта можна рекомендувати для широкого клінічного застосування.

Применение гомеопатических препаратов в комплексном лечении заболеваний пародонта

В. Д. Свердлова, Т. М. Позднякова

Исследовали эффективность применения гомеопатических препаратов в комплексном лечении заболеваний пародонта.

Применение этих препаратов существенно сокращает длительность лечения (в среднем на 5–7 дней) за счет значительного повышения защитных реакций организма и позволяет добиться продолжительной клинико-рентгенологической стабилизации у большего числа пациентов.

Результаты проведенного исследования дают основание широко рекомендовать пародонтологам включать гомеопатические препараты в комплексное лечение заболеваний пародонта.

The use of homeopathic drugs in complex treatment of parodontium diseases

V. D. Sverdlova, T. M. Pozdniakova

The effectiveness of the use of homeopathic drugs in the complex treatment of parodontium diseases has been investigated. These drugs essentially accelerate the term of treatment (average 5–7 days) due to the considerable increase of protective organism reactions and allow to achieve the long-term clinical-X-ray stabilization among the greater amount of patients.

The results of the carried out investigation enable to recommend the parodontists to include the homeopathic drugs into the complex treatment of parodontium diseases.